

医療

kenko@asahi.com


水曜掲載

脳梗塞「血栓回収療法」が進化

どうしました

Q どんな病気ですか。A 橋本病は免疫の異常を取り除く「脳血栓回収療法」が進化している。発症から4時間半以内が治療可能とされる薬による治療に比べ、より長い時間が過ぎても対応できる。治療効果を高める取り組みも盛んになっている。

脳梗塞の脳血栓回収療法の一例



川崎市内の会社員、高橋登さん(61)が体に異変を感じたのは、5月の連休最終日だった。翌日からの出勤に備えて早めに寝ようと、妻に「おやすみ」と声をかけると「顔つきが違う」と心配された。

妻によると、一点を見つめ、左手が動かせなくなっていたが「大丈夫だ」としきりに話していたという。救急隊員の口から「脳梗塞」という言葉を聞いたことを覚えている。ぼんやりした意識のなかで死を覚悟した。

市内の聖マリアンナ医科大学横浜病院に運び込まれ、中センター長によると、高橋さんが受けた治療は脳血管を除去する治療である。後遺症を残さないためには、できるだけ早くに血栓を除去して脳細胞のダメージを最小限にすることがカギになる。

同病院の植田敏浩・脳卒中センター長によると、高橋さんは「最近は、スリーブを通して脳内の血管に入れカテーテルという細い管を通して脳内の血管に届かせ、血栓を取り除く。しまった脳血管に血流を再開すると、出血に脳にさいなみが生じる。後遺症を残さないためには、できるだけ早くに血栓を除去して脳細胞のダメージを最小限にすることがカギになる。

最大で発症24時間まで機器充実

脳梗塞が起こったときの主な症状

- ①手足の片方や顔半分に力が入らなくなる
- ②手足の片方や顔半分にしびれや異常な感覚がある
- ③ろれつが回らない
- ④話そうとしても言葉がうまく出てこない
- ⑤視野が半分欠ける



治療効果高める取り組みも

Q どうしました。A 70代の母。10年以上前に橋本病が原因の甲状腺機能低下症と診断され、甲状腺ホルモン薬を服用しています。数ヶ月前から体重減少が著しく、量を減らすと改善しました。これは副作用なのでしょうか。気をつけるべきポイントを教えてください。(東京都・K)

Q どんな病気ですか。A する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。Q どんな人に多いですか。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療ふれた病気です。このうち、甲子病となる人は、軽いものも含めて3分の1ほどです。症状を放置すると意識障害など重篤になる場合もあります。

A 治療方法は、甲状腺機能低下症の場

A 橋本病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

甲子病そのものは男性よりも女性が多く、成人女性の10人に1人ともされるあります。症状がなければ治療

甲状腺機能低下症の注意点



伊藤 充さん
隸病院内科部長
II神戸市中央区

みつる

神戸市中央区

A 薬の量が多くなると、甲状腺のはたらきが高まつた

ような状態になり、代謝が活

度を調べ、薬の量を調整して

いく必要があります。

Q 生活の注意点は、

医薬品の安全性への理解を深めてもらうため、厚生労働省は、薬害事件の歴史や教訓を伝える「薬害の歴史展示室」を東京都千代田区の新宿が関ビル14階にある医薬品医療機器総合機構(PMDA)に開設した。展示室は、薬害肝炎事件の検証と再発防止を検討する委員会の2010年の提言や被害者団体の要望を受けて設置した。今年3月末の開設後、新型コロナウイルスの流行を受けて一時公開を休止して

いたが、7月中旬から再開した。展示室には国内の薬害の歴史

展示室は無料。開設時間は平日午前11時～午後4時。新型コロナの感染拡大防止のため、当面の間は事前予約制で、希望日の2営業日前までにPMDA広報課にメール(kouhou-ka@pmda.go.jp)で予約する。1組5人まで。問い合わせは同課(03-3350-069454)。(土肥修一)

Q どんな病気ですか。A 橋本病は免疫の異常を取り除く「脳血栓回収療法」が進化している。発症から4時間半以内が治療可能とされる薬による治療に比べ、より長い時間が過ぎても対応できる。治療効果を高める取り組みも盛んになっている。

Q どんな病気ですか。A する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と診断されます。

Q どんな病気ですか。A する「甲状腺ホルモン」がつかれにくくなります。顔や手足のむくみ、寒さ、だるさなどがあらわれ、甲状腺機能低下症と